

2025 年 8 月

制酸・緩下剤

(酸化マグネシウム製剤)

マグミット®錠 100mg
Magmitt Tablets 100mg

製造販売承認取得のお知らせ

このたび、酸化マグネシウム製剤「マグミット®錠 100mg」の製造販売承認を取得いたしましたので、ご案内申し上げます。

多くの患者さまの治療に貢献すべく、現在発売開始に向けて鋭意準備を進めております。

今後とも宜しくお願い申し上げます。

■効能又は効果

○下記疾患における制酸作用と症状の改善

胃・十二指腸潰瘍、胃炎(急・慢性胃炎、薬剤性胃炎を含む)、上部消化管機能異常(神経性食思不振、いわゆる胃下垂症、胃酸過多症を含む)

○便秘症

○尿路尿酸カルシウム結石の発生予防

■用法及び用量

成人

〈制酸剤として使用する場合〉

酸化マグネシウムとして、通常成人 1 日 0.5～1.0g を数回に分割経口投与する。

〈緩下剤として使用する場合〉

酸化マグネシウムとして、通常成人 1 日 2g を食前又は食後の 3 回に分割経口投与するか、又は就寝前に 1 回投与する。

〈尿路尿酸カルシウム結石の発生予防に使用する場合〉

酸化マグネシウムとして、通常成人 1 日 0.2～0.6g を多量の水とともに経口投与する。

なお、いずれの場合も年齢、症状により適宜増減する。

小児

〈緩下剤として使用する場合〉

通常、1 歳以上の小児には酸化マグネシウムとして、1 日 20～80mg/kg を食後の 2 回に分割経口投与する。

■用法及び用量に関連する注意

〈緩下剤として使用する場合〉

7.1 小児は 1 日 40mg/kg を開始用量の目安とし、患者の状態に応じて適宜増減すること。[17.1.1 参照]

●詳細は最新の電子添文をご参照くださいますようお願い申し上げます。

【お問い合わせ】

マグミット製薬株式会社 営業本部 学術情報課 087-813-5007

(受付時間:月～金 9:00～17:00 祝祭日および当社休日を除く)