

マグミット®K <便秘薬>

第3類医薬品

特長

1. お腹への刺激が少なく、お腹にやさしい便秘薬です。
2. 固い便を水状でなく、ほどよい柔らかさにし、スムーズなお通じを促します。
3. 寝る前に飲めば、朝の自然なお通じにつながります。

⚠️ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。
他の瀉下薬（下剤）

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
(3) 高齢者
(4) はげしい腹痛、吐き気・嘔吐のある人
(5) 腎臓病の診断を受けた人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
消化器	はげしい腹痛、吐き気・嘔吐
精神神経系	強い眠気、意識がうすれる
循環器	立ちくらみ、脈が遅くなる
呼吸器	息苦しい
その他	筋力の低下、口のかわき

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
下痢
4. 1週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

- 便秘
- 便秘に伴う次の症状の緩和：頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振（食欲減退）、腹部膨満、腸内異常醗酵、痔

用法・用量

次の1回量を1日1回、就寝前（又は空腹時）に水又はぬるま湯で服用してください。
ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量又は減量してください。

年齢	成人（15才以上）	11才～14才	7才～10才	5才～6才	5才未満
1回量	3～6錠	2～4錠	2～3錠	1～2錠	×服用しないこと

●空腹時の目安：食後なるべく2時間以上

<用法・用量に関連する注意>

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)錠剤の取り出し方

右図のように、錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出してお飲みください。

（誤ってそのまま飲み込んだりすると、食道粘膜に突き刺さるなど思わぬ事故につながります。）



成分と作用

成分	6錠中	作用
酸化マグネシウム	1980mg	腸に水分を集めて便をやわらかくすることで、スムーズなお通じを促します

添加物：セルロース、クロスカルメロースNa、ステアリン酸Ca

保管及び取扱い上の注意

- (1)直接日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く服用してください。（品質保持のため）

お問い合わせ先

お問い合わせ先

マグミット製薬株式会社 お客様相談窓口 電話087-802-1020
受付時間：9時から16時30分まで（土、日、祝日、会社の休日を除く）

製造販売元



マグミット製薬株式会社

香川県木田郡三木町大字井上2876番地2